



**Cationic diazacyanine dyes.**

**Patent number:** EP0624628  
**Publication date:** 1994-11-17  
**Inventor:** MEISEL KARLHEINRICH DR (DE)  
**Applicant:** BAYER AG (DE)  
**Classification:**  
- international: **C09B44/14; C09B44/00;** (IPC1-7): D06P1/41;  
D06P3/24; D06P3/52; D06P3/70; C09B44/14  
- european: C09B44/14  
**Application number:** EP19940106398 19940425  
**Priority number(s):** DE19934315383 19930508

**Also published as:**

 JP6329934 (A)  
 DE4315383 (A1)

**Cited documents:**


 US3585182  
 DE2643639  
 US3515715  
 EP0055224  
 FR1486066

**Report a data error here**

**Abstract of EP0624628**

Novel cationic diazacyanine dyes of the formula (I) where R<1> is optionally substituted alkyl or optionally substituted aryl, R<2> is hydrogen, optionally substituted alkyl or optionally substituted aryl, R<3> is optionally substituted alkoxy carbonyl, optionally substituted aminocarbonyl or cyano, R<4> is hydrogen or optionally substituted alkyl, R<5> is optionally substituted alkyl or optionally substituted aryl, R<6> is hydrogen, optionally substituted alkyl, halogen, amino optionally substituted by alkyl or aryl, which in turn can each be optionally substituted, cyano, nitro, optionally substituted alkoxy carbonyl, optionally substituted alkyl carbonyl, optionally substituted aralkyl carbonyl, optionally substituted alkylsulphonyl, optionally substituted aralkylsulphonyl, optionally substituted arylsulphonyl or aminosulphonyl optionally substituted by alkyl or aryl, which in turn can each be optionally substituted, and X<-> is an equivalent of an anion customary in dyestuff chemistry, a process for their preparation and their use for dyeing and printing textile fibre materials.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



Veröffentlichungsnummer: **0 624 628 A1**

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(41) Anmeldenummer: 94106398.4

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **C09B 44/14, //D06P3/24, D06P3/52, D06P3/70, D06P1/41**

(22) Anmeldetag: 25.04.94

(30) Priorität: 08.05.93 DE 4315383

(71) Anmelder: **BAYER AG**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
17.11.94 Patentblatt 94/46


**D-51368 Leverkusen (DE)**

(94) Benannte Vertragsstaaten:  
**CH DE FR GB LI**

(72) Erfinder: **Melsel, Karlheinz, Dr.  
Engstenberger Höhe 11  
D-51519 Odenthal (DE)**

(94) **Kationische Diazacyaninfarbstoffe.**

(97) **Neue kationische Diazacyaninfarbstoffe der Formel (I)**



In der

- R<sup>1</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,  
R<sup>2</sup> für Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,  
R<sup>3</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkoxy-carbonyl, gegebenenfalls substituiertes Aminocarbonyl oder Cyano,  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl,  
R<sup>5</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,  
R<sup>6</sup> für Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Halogen, gegebenenfalls durch Alkyl oder Aryl, die ihrerseits gegebenenfalls substituiert sein können, substituiertes Amino, Cyano, Nitro, gegebenenfalls substituiertes Alkoxy-carbonyl, gegebenenfalls substituiertes Alkyl-carbonyl, gegebenenfalls substituiertes Aralkyl-carbonyl, gegebenenfalls substituiertes Alkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Aralkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Arylsulfonyl oder gegebenenfalls durch Alkyl oder Aryl, die ihrerseits gegebenenfalls substituiert sein können, substituiertes Aminosulfonyl und  
X<sup>o</sup> für ein Äquivalent eines in der Farbstoffchemie üblichen Anions stehen,

ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung zum Färben und Bedrucken von Textilfasermaterialien.

Rank Xerox (UK) Business Services  
13.10/3.09/3.3.41

EP 0 624 628 A1

## EP 0 624 628 A1


Die vorliegende Erfindung betrifft neue kationische Diazacyaninfarbstoffe, ein Verfahren zu deren Herstellung, ihre Verwendung zum Färben und Bedrucken von Textilfasermaterialien und Textilfasermaterialien, welche mit den neuen kationischen Diazacyaninfarbstoffen gefärbt oder bedruckt sind.

Es wurden kationische Diazacyaninfarbstoffe der Formel (I) gefunden

5

10

15



20

in der

- R<sup>1</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,  
 R<sup>2</sup> für Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,  
 R<sup>3</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkoxycarbonyl, gegebenenfalls substituiertes Aminocarbonyl  
 oder Cyano,  
 R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl,  
 R<sup>5</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,  
 R<sup>6</sup> für Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Halogen, gegebenenfalls durch Alkyl oder  
 Aryl, die ihrerseits gegebenenfalls substituiert sein können, substituiertes Amino, Cyano, Nitro,  
 gegebenenfalls substituiertes Alkoxycarbonyl, gegebenenfalls substituiertes Alkylcarbonyl, gege-  
 benenfalls substituiertes Aralkylcarbonyl, gegebenenfalls substituiertes Alkylsulfonyl, gegebenen-  
 falls substituiertes Aralkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Arylsulfonyl oder gegebenenfalls  
 durch Alkyl oder Aryl, die ihrerseits gegebenenfalls substituiert sein können, substituiertes  
 Aminosulfonyl und  
 X<sup>e</sup> für ein Äquivalent eines in der Farbstoffchemie üblichen Anions stehen.

35

Bei den Alkylgruppen, bei substituierten Alkylgruppen und solchen in kombinierten Molekülteilen, die Alkylgruppen enthalten, wie in Alkoxycarbonyl, durch Alkyl substituiertes Amino, Alkylcarbonyl, Aralkylcarbonyl, Alkylsulfonyl, Aralkylsulfonyl und durch Alkyl substituiertes Aminosulfonyl, kann es sich beispielsweise um C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylgruppen handeln.

40

Bei den Arylgruppen, bei substituierten Arylgruppen und solchen in kombinierten Molekülteilen, die Arylgruppen enthalten, wie durch Aryl substituiertes Amino, Aralkylcarbonyl, Aralkylsulfonyl, Arylsulfonyl und durch Aryl substituiertes Aminosulfonyl, kann es sich beispielsweise um C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylgruppen handeln.

Bei Halogengruppen, auch solchen in kombinierten Molekülteilen, die Halogengruppen enthalten, wie durch Halogen substituiertes Alkyl oder Phenoxyl, kann es sich beispielsweise um Fluor, Chlor oder Brom handeln. Besonders bevorzugt ist Chlor.

45

In der Farbstoffchemie übliche Anionen sind beispielsweise Chlorid, Bromid, Sulfat, Methylsulfat, Acetat, Lactat, Tetrafluorborat, Trichlorzinkat, Tetrachlorzinkat und Tetrachlorferrat.

Bei bevorzugten Farbstoffen der Formel (I) steht

50

- R<sup>1</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Phenyl, Hydroxy, Carbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, Halogen, Cyano, gegebenenfalls substituiertes Amino, Aminocarbonyl, Sulfonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxysulfonyl, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylsulfonyloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl der Formel Aryl-SO<sub>2</sub>-O-alkyl, Phenoxysulfonyl oder Aminosulfonyl substituiert ist,  
 wobei bei Phenylsubstituenten das Phenyl gegebenenfalls ein- bis viermal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Halogen, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy der Formel Aryl-alkoxy-, Cyano, Nitro,  
 55 Acetyl oder Benzoyl substituiert sein kann, Aminocarbonyl, das gegebenenfalls seinerseits ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann, Sulfonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl oder Aminosulfonyl substituiert sein kann, wobei bei Aminosulfonylsubstituenten die Aminogruppe

## EP 0 624 628 A1

gegebenenfalls ihrerseits ein- bis zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann, und

wobei bei Amino-, Aminocarbonyl- oder Aminosulfonylsubstituenten die Aminogruppe gegebenenfalls jeweils ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Phenyl oder Acetyl substituiert sein kann, oder

für Phenyl, das gegebenenfalls durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy der Formel Alkoxy-aryl-, Amino, Aminocarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxysulfonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylsulfonyl-oxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl der Formel Aryl-SO<sub>2</sub>-O-Alkyl-, Sulfonyl, Phenoxy-sulfonyl, Cyano, Nitro, Hydroxy oder Carboxyl substituiert ist,

wobei Aminosubstituenten gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, Phenyl oder Acetyl substituiert sein können und

wobei bei Aminocarbonyl- und Aminosulfonylsubstituenten die Aminogruppe gegebenenfalls jeweils ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,

R<sup>2</sup> für Wasserstoff für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann wie bei der Definition von Alkyl bei R<sup>1</sup> angegeben oder für Phenyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann wie bei der Definition von Phenyl bei R<sup>1</sup> angegeben,

R<sup>3</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bei R<sup>1</sup> angegeben, für Aminocarbonyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituierten Aminocarbonyl bei R<sup>1</sup> angegeben oder für Cyano,

R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bei R<sup>1</sup> angegeben,

R<sup>5</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bei R<sup>1</sup> angegeben oder für Phenyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von Phenyl bei R<sup>1</sup> angegeben,

R<sup>6</sup> für Wasserstoff, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bei R<sup>1</sup> angegeben, für Chlor, für Amino, Aminocarbonyl oder Aminosulfonyl, die gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein können wie bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das mit diesen Resten substituiert ist, bei R<sup>1</sup> angegeben, für Cyano, für Nitro, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl, für C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl, für C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl, für C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylsulfonyl oder für Aminosulfonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann und

X<sup>o</sup> für ein Äquivalent von Chlorid, Bromid, Sulfat, Methylsulfat, Acetat, Lactat, Tetrafluorborat, Trichlorzinkat, Tetrachlorzinkat oder Tetrachlorferrat.

Bei besonders bevorzugten Farbstoffen der Formel (I) steht

R<sup>1</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- bis zweimal durch Phenyl, Hydroxy, Chlor, Cyano oder Aminocarbonyl substituiert sein kann oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Cyano, Nitro, Hydroxy oder Amino, das gegebenenfalls seinerseits ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Phenyl oder Acetyl substituiert sein kann,

R<sup>2</sup> für Wasserstoff, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Cyano oder Aminocarbonyl substituiert sein kann oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl oder Cyano substituiert sein kann

R<sup>3</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, das gegebenenfalls ein- bis zweimal durch Phenyl substituiert sein kann, für Aminocarbonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann oder für Cyano,

R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- bis zweimal durch Chlor, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, Phenyl oder Aminocarbonyl substituiert sein kann, wobei Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,

R<sup>5</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Chlor oder Cyano substituiert sein kann oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Chlor, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, Sulfonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxysulfonyl, Amino oder Aminocarbonyl substituiert sein kann, wobei Amino und Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,

R<sup>6</sup> für Wasserstoff, für Chlor, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Amino oder Aminocarbonyl substituiert sein können, wobei Amino und Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein können, für Amino, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder

## EP 0 624 628 A1

zweimal durch Cyano, Chlor oder Phenyl substituiert sein kann, für Aminocarbonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann, für Cyano, für Nitro, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfon, für Phenylsulfon oder für Aminosulfon, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann und

X<sup>o</sup> die oben angegebene Bedeutung hat.

Bei ganz besonders bevorzugten Farbstoffen der Formel (I) steht

R<sup>1</sup> für Methyl, Ethyl oder Phenyl,

R<sup>2</sup> für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Cyanomethyl, Aminocarbonylmethyl oder Phenyl,

R<sup>3</sup> für Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Benzoxycarbonyl, Cyano oder Aminocarbonyl,


R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls durch eine Phenyl-, Cyano- oder Aminocarbonylgruppe substituiert sein kann, wobei Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,

R<sup>5</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls durch eine Cyanogruppe substituiert sein kann, oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl, Amino, Cyano, Aminocarbonyl, Methoxy, Ethoxy, Methoxycarbonyl oder Ethoxycarbonyl substituiert sein kann, wobei Amino gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl oder Ethyl und Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl oder Phenyl substituiert sein kann und


R<sup>6</sup> für Wasserstoff, für Methyl oder Ethyl, die gegebenenfalls durch eine Cyano-, Methoxy-, Ethoxy-, Amino- oder Aminocarbonylgruppe substituiert sein können, wobei Amino gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl oder Ethyl und Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl oder Phenyl substituiert sein kann, für Amino, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl, Cyanomethyl, Cyanethyl, Methylphenyl oder Ethylphenyl substituiert sein kann, für Aminocarbonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl oder Phenyl substituiert sein kann, für Cyano, für Nitro, für Methoxycarbonyl, für Ethoxycarbonyl, für Methylsulfon, für Ethylsulfon, Phenylsulfon oder Aminosulfon in 5-Stellung und

X<sup>o</sup> für ein Äquivalent von Chlorid, Acetat, Trichlorzinkat oder Tetrachlorferrat.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung von kationischen Diazacyanin-farbstoffen der Formel (I), das dadurch gekennzeichnet ist, daß man eine Verbindung der Formel (II)



in der R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> die bei Formel (I) angegebene Bedeutung haben, mit Nitrosylschwefelsäure in Gegenwart von Essigsäure und/oder Propionsäure diazotiert, das Diazotierungsprodukt mit einer Verbindung der Formel (III) umsetzt



in der R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> die bei Formel (I) angegebene Bedeutung haben, kuppelt und die entstandenen Azofarbstoffe mit einem Methylierungsmittel in einem Lösungsmittel methyliert.

Die Diazotierung kann beispielsweise bei Temperaturen unter +10 °C, vorzugsweise unter +5 °C, die Kupplung beispielsweise bei Temperaturen unter +30 °C, vorzugsweise unter +25 °C und die Methylierung beispielsweise bei 40 bis 90 °C, vorzugsweise 70 bis 90 °C durchgeführt werden.

## EP 0 624 628 A1

Die Reaktanden werden bevorzugt im stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt, man kann jedoch auch einen der Reaktanden im Überschuß einsetzen, beispielsweise die Kupplungskomponente in einer Menge von 1,01 bis 1,20 Mol, bezogen auf das Diazotierungsprodukt der Verbindung der Formel (II).

Methylierungsmittel können beispielsweise Dimethylsulfat, Methylchlorid, Methyljodid, Dimethylcarbonat und Phosphorsäuretrimethylester sein. Als Lösungsmittel für die Methylierung kommen z.B. N-Methylpyrrolidon und Dimethylformamid infrage.

Aus dem nach der Diazotierung, Kupplung und Methylierung vorliegenden Reaktionsgemisch kann man die Farbstoffe der Formel (I), z.B. isolieren, indem man das Reaktionsgemisch auf einen Überschuß Wasser austrägt, Kochsalz zufügt und den Farbstoff der Formel (I) durch Filtration abtrennt und gegebenenfalls wäscht. In manchen Fällen fällt der Farbstoff der Formel (I), gegebenenfalls nach Abkühlung, direkt aus. Man kann dann auf die Zugabe von Kochsalz verzichten.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin die Verwendung von kationischen Diazacyaninfarbstoffen der Formel (I) zum Färben und Bedrucken von Textilfasermaterialien. Hierfür sind besonders Textilfasermaterialien geeignet, die aus Polyacrylnitril, sauer modifizierten Polyamiden und/oder sauer modifizierten Polyester bestehen oder eines oder mehrere dieser Materialien enthalten. Das Färben und das Bedrucken solcher Materialien mit den Farbstoffen der Formel (I) kann nach an sich bekannten Methoden erfolgen.

Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung auch Textilfasermaterialien, die mit kationischen Diazacyaninfarbstoffen der Formel (I) gefärbt oder bedruckt sind.

Die erfindungsgemäßen kationischen Diazacyaninfarbstoffe ergeben brillante und farbstarke gelbe bis orangefarbene Färbungen mit hohen Lichtechtheiten und guten Wasch-, Schweiß- und Dekaturechtheiten. Die Farbstoffe sind in einem großen pH-Bereich, z.B. von 2 bis 7, stabil und können gegebenenfalls mit anderen kationischen Farbstoffen kombiniert angewendet werden.

Gegenüber bekannten Diazacyaninfarbstoffen, beispielsweise solchen die der Formel (I) entsprechen, jedoch als Substituent  $R^3$  Wasserstoff oder Methyl enthalten (siehe z.B. US-A 3 585 128, US-A 3 515 715, EP-A 55 224), zeichnen sich die erfindungsgemäßen Farbstoffe insbesondere dadurch aus, daß sie, falls sie in unbeabsichtigter Weise in die Umwelt geraten, dort eine stark verminderte Daphnien-, Fisch- und Algentoxizität aufweisen. Die erfindungsgemäßen Farbstoffe können deshalb mit weniger Aufwand transportiert werden.

### 30 Beispiele


#### Beispiel 1

##### a) Diazotierung

In 50 ml 96 Gew.-%iger Schwefelsäure wurden langsam 7,2 g Natriumnitrit eingetragen und 100 ml einer Mischung aus 1 Gew.-Teil Propionsäure und 5 Gew.-Teilen Essigsäure zugegeben. Bei einer Temperatur von weniger als +3°C wurden langsam 10,9 g 1-Methyl-4-cyano-5-aminopyrazol und 100 ml des oben angegebenen Propionsäure-Essigsäure-Gemisches zugefügt. Es wurde noch 2 Stunden bei einer Temperatur von unter +3°C nachgerührt.

##### b) Kupplung

14,5 g 1,2-Dimethylindol wurden in 100 ml des auch bei a) eingesetzten Propionsäure-Essigsäure-Gemisches gelöst und diese Lösung bei Temperaturen unter +5°C langsam mit der gemäß a) hergestellten Diazoniumsalzlösung versetzt. Die vereinigten Lösungen wurden anschließend mit Natriumacetat auf einen pH-Wert von 5 eingestellt, mit 1,5 l Wasser verdünnt, 10 Minuten verrührt und dann abgesaugt. So wurden 21,9 g des Azofarbstoffs der Formel



erhalten.

##### c) Methylierung

11,1 g des gemäß b) erhaltenen Azofarbstoffs wurden in 100 ml N-Methylpyrrolidon mit 25 ml Dimethylsulfat 13 Stunden bei 80°C methyliert. Danach wurde abgekühlt, abgesaugt und mit N-

## EP 0 624 628 A1

Methylpyrrolidon gewaschen. Der feuchte Filterkuchen wurde in 400 ml 5 Gew.-%iger wäßriger Kochsalzlösung 2 Stunden bei Raumtemperatur verrührt. Dann wurde abgetrennt und der Niederschlag mit 5 Gew.-%iger Kochsalzlösung gewaschen. Es wurden 12,3 g des Farbstoffs der Formel (I) mit  $R^1 = CH_3$ ,  $R^2 = H$ ,  $R^3 = CN$ ,  $R^4 = CH_3$ ,  $R^5 = CH_3$  und  $R^6 = H$  erhalten. Der  $\lambda_{max}$ -Wert dieses Farbstoffs betrug 458 nm.

Beispiele 2 bis 67

Diese Beispiele wurden analog Beispiel 1 durchgeführt. Dabei wurden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Produkte erhalten.

## EP 0 624 628 A1

**Tabelle 1**

<sup>5</sup>	Beispiel	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	$\lambda_{\max}$
	2	Me	H	COOEt	H	Me	H	424
10	3	Me	H	COOEt	Me	Me	H	435
	4	Me	H	COOEt	H	Ph	H	451
	5	Me	H	COOEt	Me	Ph	H	443
15	6	Me	H	COOEt	Me	4-Cl-Ph	H	442
	7	Me	H	COOEt	Me	4-OCH <sub>3</sub> -Ph	H	453
	8	Me	H	COOEt	Me	Ph	5-Me	446
20	9	Me	H	COOEt	Me	Ph	6-Cl	439
	10	Ph	H	COOEt	H	Me	H	440
	11	Ph	H	COOEt	Me	Me	H	447
25	12	Ph	H	COOEt	H	Ph	H	461
	13	Ph	H	COOEt	Me	Ph	H	451
	14	Me	H	CN	H	Me	H	453
30	15	Me	H	CN	Me	Me	H	458
	16	Me	H	CN	H	Ph	H	480
	17	Me	H	CN	Me	Ph	H	451
35	18	Me	H	CN	Me	4-Cl-Ph	H	469
	19	Me	H	CN	Me	4-OCH <sub>3</sub> -Ph	H	478
40	20	Me	H	CN	Me	Ph	5-Me	471
	21	Me	H	CN	Me	Ph	6-Cl	467
	22	Ph	H	CN	H	Me	H	465
45	23	Ph	H	CN	Me	Me	H	468
	24	Ph	H	CN	H	Ph	H	494
	25	Ph	H	CN	Me	Ph	H	481

50

55



## EP 0 624 628 A1

**Tabelle 1-** I. Fortsetzung

5	Beispiel	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	$\lambda_{\max}$
	26	Ph	Me	CN	Me	H	H	454
10	27	Ph	Me	CN	Me	Me	H	463
	28	Ph	Me	CN	H	Ph	H	493
	29	Ph	Me	CN	Me	Ph	H	480
15	30	Me	Me	CN	H	Ph	H	480
	31	Me	Me	CN	Me	Ph	H	468
	32	Me	Me	CN	H	Me	H	452
20	33	Me	Me	CN	Me	Me	H	457
	34	Ph	CH <sub>2</sub> CN	CN	H	Ph	H	488
	35	Ph	CH <sub>2</sub> CN	CN	Me	Ph	H	473
25	36	Ph	CH <sub>2</sub> CN	CN	H	Me	H	458
	37	Ph	CH <sub>2</sub> CN	CN	Me	Me	H	464
	38	Me	H	CONH <sub>2</sub>	H	Ph	H	463
30	39	Me	H	CONH <sub>2</sub>	Me	Ph	H	459
	40	Me	H	CONH <sub>2</sub>	Me	Me	H	448
35	41	Ph	H	CONH <sub>2</sub>	H	Ph	H	476
	42	Ph	H	CONH <sub>2</sub>	Me	Ph	H	472
	43	Ph	H	CONH <sub>2</sub>	H	Me	H	460
40	44	Ph	H	CONH <sub>2</sub>	Me	Me	H	467
	45	Me	Me	COOEt	H	Ph	H	447
	46	Me	Me	COOEt	Me	Ph	H	442
45	47	Me	Me	COOEt	Me	Me	H	433
	48	Ph	Me	COOEt	H	Ph	H	429
	49	Ph	Me	COOEt	Me	Ph	H	423

50

55

## EP 0 624 628 A1

**Tabelle 1-** 2. Fortsetzung

6	Beispiel	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	$\lambda_{\text{max}}$
	50	Ph	Me	COOEt	H	Me	H	418
10	51	Ph	Me	COOEt	Me	Me	H	424
	52	Me	Me	COOMe	Me	Me	H	432
	53	Ph	Me	COOMe	H	Ph	H	436
15	54	Ph	Me	COOMe	Me	Ph	H	444
	55	Ph	Me	COOMe	H	Me	H	414
	56	Me	CH <sub>2</sub> CN	CN	H	Ph	H	472
20	57	Me	CH <sub>2</sub> CN	CN	Me	Ph	H	466
	58	Me	CH <sub>2</sub> CN	CN	H	Me	H	438
	59	Me	CH <sub>2</sub> CN	CN	Me	Me	H	452
25	60	Me	Ph	CN	H	Ph	H	476
	61	Me	Ph	CN	Me	Ph	H	464
	62	Ph	Ph	CN	H	Ph	H	482
30	63	Ph	Ph	CN	Me	Ph	H	478
	64	Ph	Ph	CN	H	Me	H	454
	65	Ph	Ph	CN	Me	Me	H	463
35	66	Me	H	COOMe	H	Ph	H	461
	67	Me	H	COOMe	Me	Ph	H	442

40 Me = Methyl, Et = Ethyl, Ph = Phenyl


## 45 Patentansprüche

1. Kationische Diazacyaninfarbstoffe der Formel (I)

50

55

## EP 0 624 628 A1



- 15 in der
- R<sup>1</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,
- R<sup>2</sup> für Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,
- R<sup>3</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkoxy-carbonyl, gegebenenfalls substituiertes Aminocarbo-
- 20 nyl oder Cyano,
- R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes Alkyl,
- R<sup>5</sup> für gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder gegebenenfalls substituiertes Aryl,
- R<sup>6</sup> für Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Halogen, gegebenenfalls durch Alkyl
- 25 oder Aryl, die ihrerseits gegebenenfalls substituiert sein können, substituiertes Amino, Cyano, Nitro, gegebenenfalls substituiertes Alkoxy-carbonyl, gegebenenfalls substituiertes Alkylcar-
- bonyl, gegebenenfalls substituiertes Alkylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Arylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Arylsulfonyl, gegebenenfalls substituiertes Arylsulfonyl
- 30 oder gegebenenfalls durch Alkyl oder Aryl, die ihrerseits gegebenenfalls substituiert sein können, substituiertes Aminosulfonyl und
- X<sup>o</sup> für ein Äquivalent eines in der Farbstoffchemie üblichen Anions stehen.

30 2. Farbstoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I)

- R<sup>1</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Phenyl, Hydroxy, Carbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-
- 35 Alkoxy-carbonyl, Halogen, Cyano, gegebenenfalls substituiertes Amino, Aminocarboxyl, Sulfo-
- nyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-sulfonyl, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylsulfonyloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl der Formel Aryl-SO<sub>2</sub>-O-alkyl-,
- Phenoxy-sulfonyl oder Aminosulfonyl substituiert ist,
- wobei bei Phenylsubstituenten das Phenyl gegebenenfalls ein- bis viermal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,
- Halogen, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy der Formel Aryl-alkoxy-, Cyano,
- 40 Nitro, Hydroxy, Amino, das gegebenenfalls seinerseits ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,
- Phenyl, Acetyl oder Benzoyl substituiert sein kann, Aminocarboxyl, das gegebenenfalls
- seinerseits ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann, Sulfonyl,
- C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl oder Aminosulfonyl substituiert sein kann, wobei bei Amino-, Aminocar-
- 45 boxyl- oder Aminosulfonylsubstituenten die Aminogruppe gegebenenfalls jeweils ein- oder
- zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Phenyl oder Acetyl substituiert sein kann, oder
- für Phenyl, das gegebenenfalls durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy
- 50 der Formel Alkoxy-aryl-, Amino, Aminocarboxyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-sulfonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl,
- C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylsulfonyl-oxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl der Formel Aryl-SO<sub>2</sub>-O-Alkyl-, Sulfonyl, Phenoxy-sulfonyl,
- Cyano, Nitro, Hydroxy oder Carboxyl substituiert ist,
- wobei Aminosubstituenten gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, Phenyl oder
- Acetyl substituiert sein können und
- 55 wobei bei Aminocarboxyl- und Aminosulfonylsubstituenten die Aminogruppe gegebenenfalls
- jeweils ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,
- R<sup>2</sup> für Wasserstoff, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann
- wie bei der Definition von Alkyl bei R<sup>1</sup> angegeben oder für Phenyl, das gegebenenfalls in
- 60 gleicher Weise substituiert sein kann wie bei der Definition von Phenyl bei R<sup>1</sup> angegeben,
- R<sup>3</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie
- 65 bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bei R<sup>1</sup> angegeben, für Aminocarboxyl, das gegebenenfalls
- in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituierten
- Aminocarboxyl bei R<sup>1</sup> angegeben oder für Cyano,

**EP 0 624 628 A1**

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
|    | R <sup>4</sup> | für Wasserstoff oder für C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl bei R <sup>1</sup> angegeben,   |
|    | R <sup>5</sup> | für C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl bei R <sup>1</sup> angegeben oder für Phenyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von Phenyl bei R <sup>1</sup> angegeben,   |
| 5  | R <sup>6</sup> | für Wasserstoff, für C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl, das gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein kann, wie bei der Definition von C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl bei R <sup>1</sup> angegeben, für Chlor, für Amino, Aminocarbonyl oder Aminosulfonyl, die gegebenenfalls in gleicher Weise substituiert sein können wie bei der Definition von C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl, das mit diesen Resten substituiert ist, bei R <sup>1</sup> angegeben, für   |
| 10 |                | Cyano, für Nitro, für C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkoxy-carbonyl, für C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl-carbonyl, für C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> -Aryl-C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl-carbonyl, für C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl-sulfonyl, für C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> -Aryl-C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl-sulfonyl, für C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> -Aryl-sulfonyl oder für Aminosulfonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal mit C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann und |
| 15 | X <sup>o</sup> | für ein Äquivalent von Chlorid, Bromid, Sulfat, Methylsulfat, Acetat, Lactat, Tetrafluoroborat, Trichlorzinkat, Tetrachlorzinkat oder Tetrachlorerrat stehen.   |

3. Farbstoffe nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I)

- R<sup>1</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- bis zweimal durch Phenyl, Hydroxy, Chlor, Cyano oder Aminocarbonyl substituiert sein kann oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Cyano, Nitro, Hydroxy oder Amino, das gegebenenfalls seinerseits ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Phenyl oder Acetyl substituiert sein kann,
- R<sup>2</sup> für Wasserstoff, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Cyano oder Aminocarbonyl substituiert sein kann oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl oder Cyano substituiert sein kann
- R<sup>3</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl, das gegebenenfalls ein- bis zweimal durch Phenyl substituiert sein kann, für Aminocarbonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann oder für Cyano,
- R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- bis zweimal durch Chlor, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl, Phenyl oder Aminocarbonyl substituiert sein kann, wobei Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,
- R<sup>5</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Chlor oder Cyano substituiert sein kann oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Chlor, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl, Sulfonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-sulfonyl, Amino oder Aminocarbonyl substituiert sein kann, wobei Amino und Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,
- R<sup>6</sup> für Wasserstoff, für Chlor, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Amino oder Aminocarbonyl substituiert sein können, wobei Amino und Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein können, für Amino, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Cyano, Chlor oder Phenyl substituiert sein kann, für Aminocarbonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann, für Cyano, für Nitro, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl-carbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl-sulfonyl, für Phenyl-sulfonyl oder für Aminosulfonyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann stehen und
- X<sup>o</sup> die in Anspruch 2 angegebene Bedeutung hat.


4. Farbstoff nach Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I)

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 50 | R <sup>1</sup><br>R <sup>2</sup><br>R <sup>3</sup><br>R <sup>4</sup> | für Methyl, Ethyl oder Phenyl,<br>für Wassertoff, Methyl, Ethyl, Cyanomethyl, Aminocarbonylmethyl oder Phenyl,<br>für Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Benzoxycarbonyl, Cyano oder Aminocarbonyl,<br>für Wasserstoff oder C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl, das gegebenenfalls durch eine Phenyl-, Cyano- oder Aminocarbonylgruppe substituiert sein kann, wobei Aminocarbonyl gegebenenfalls ein- oder |
| 55 | R <sup>5</sup>   | zweimal durch C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl oder Phenyl substituiert sein kann,<br>für C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -Alkyl, das gegebenenfalls durch eine Cyanogruppe substituiert sein kann, oder für Phenyl, das gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl, Amino, Cyano, Aminocarbonyl, Methoxy, Ethoxy, Methoxycarbonyl oder Ethoxycarbonyl substituiert sein kann, wobei           |


## EP 0 624 628 A1

Amino gegebenenfalls ein- oder zweimal durch Methyl oder Ethyl und Aminocarbonyl  
 gegebenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl oder Phenyl substituiert sein kann und  
 für Wasserstoff, für Methyl oder Ethyl, die gegebenenfalls durch eine Cyano-, Methoxy-,  
 Ethoxy, Amino- oder Aminocarbonylgruppe substituiert sein können, wobei Amino gegebe-  
 5 nenfalls ein- oder zweimal durch Methyl oder Ethyl und Aminocarbonyl gegebenfalls ein-  
 oder zweimal durch Methyl, Ethyl oder Phenyl substituiert sein kann, für Amino, das  
 gegebenfalls ein- oder zweimal durch Methyl, Ethyl, Cyanmethyl, Cyanethyl, Methylphenyl  
 oder Ethylphenyl substituiert sein kann, für Aminocarbonyl, das gegebenfalls ein- oder  
 10 zweimal durch Methyl, Ethyl oder Phenyl substituiert sein kann, für Cyano, für Nitro, für  
 Methoxycarbonyl, für Ethoxycarbonyl, für Methylsulfonyl, für Ethylsulfonyl, Phenylsulfonyl  
 oder Aminosulfonyl in 5-Stellung und  
 X<sup>o</sup> für ein Äquivalent von Chlorid, Acetat, Trichlorzinkat oder Tetrachlorferrat stehen.

5. Verfahren zur Herstellung von kationischen Diazacyaninfarbstoffen des Anspruchs 1, dadurch gekenn-  
 15 zeichnet, daß man eine Verbindung der Formel (II)



in der R¹, R² und R³ die bei Formel (I) angegebene Bedeutung haben, mit Nitrosylschwefelsäure in  
 Gegenwart von Essigsäure und/oder Propionsäure diazotiert, das Diazotierungsprodukt mit einer  
 Verbindung der Formel (III) umsetzt



in der R⁴, R⁵ und R⁶ die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben,  
 kuppelt und die entstandenen Azofarbstoffe mit einem Methylierungsmittel in einem Lösungsmittel  
 methyliert.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß man die Diazotierung unter +10 °C, die  
 Kupplung unter +30 °C und die Methylierung bei 40 bis 90 °C durchführt.
7. Verfahren nach Ansprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß man die Kupplungskomponente in  
 einer Menge von 1,01 bis 1,20 Mol, bezogen auf das Diazotierungsprodukt der Verbindung der Formel  
 (II) einsetzt.
8. Verwendung von kationischen Diazacyaninfarbstoffen des Anspruchs 1 zum Färben und Bedrucken von  
 Textilfasermaterialien.
9. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Textilfasermaterialien um  
 solche handelt, die aus Polyacrylnitril, sauer modifizierten Polyamiden oder sauer modifizierten Polye-  
 65 stern bestehen oder eines oder mehrere dieser Materialien enthalten.
10. Textilfasermaterialien, dadurch gekennzeichnet, daß sie mit kationischen Diazacyaninfarbstoffen des  
 Anspruchs 1 gefärbt oder bedruckt sind.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 6398

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
D,X	US-A-3 585 182 (J.M.STRALEY ET AL.) * Spalte 4, Zeilen 9-70; Spalte 5, Zeilen 41-48 * * Spalte 27, Zeile 20 - Spalte 28, Zeile 31; Beispiele 69,70 *	1-10	C09B44/14 //D06P3/24, D06P3/52, D06P3/70, D06P1/41
D,Y	---	5-10	
Y	DE-A-26 43 639 (PRODUITS CHIMIQUES UGINE KUHLMANN) * Seite 7, Absatz 3 - Seite 8, Absatz 1; Ansprüche 3,4 *	5-10	
A,D	US-A-3 515 715 (J.M.STRALEY ET AL.) * Ansprüche; Beispiele *	1-10	
A,D	EP-A-0 055 224 (CIBA-GEIGY AG.) * Beispiele 1,7,8,9 *	1-10	
A	FR-A-1 486 066 (J.R. GEIGY S.A.) * Zusammenfassung; Ansprüche *	1-10	
			BEFORSCHTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			C09B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt		Prüfer	
DEN HAAG		Ginoux, C	
Abgeschlossen der Recherche		25. August 1994	
KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund D : schriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : direktes Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument			
A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überreicht am selben Datum			

EP 94 10 6398 (PUB.02)